

PROSPECT

ADENOLIN capsule

ADENOLIN – complex biologic activ de origine vegetală destinat pentru menținerea funcției normale a prostatei, sistemului cardiovascular și tractului gastrointestinal.

COMPOZIȚIA

Denumirea ingredientelor active	Cantitatea pentru 1 capsulă
Ulei din semințe de dovleac (<i>Cucurbita pepo L.</i> , semen), cu conținut de:	
- acizi grași polinesaturati 80 %	300 mg
Ulei din fructe de cătină (<i>Hippophae rhamnoides L.</i> , fructus), cu conținut de:	
- acizi grași polinesaturati 90 %	100 mg
- β-caroten 300 mg/100 g, echivalent cu 50 mg/100 g vitamina A	90 mg 50 µg ER

Ingrediente: ulei din semințe de dovleac; ulei din fructe de cătină; capsulă gelatinăosă tare (galben opus de soare /sunset yellow/ FCF, ponceau 4R); amidon de porumb; substanță suport dioxid de siliciu amorf; **lactoză monohidrată**; agent antiaglomerant stearat de magneziu.

PROPRIETĂȚI

Uleiurile din fructe de cătină și din semințe de dovleac conțin complexul de vitamine liposolubile A și E, acizi grași polinesaturati (oleic, linoleic, linolenic, arahidonic), carotenoli, tocoferoli, fosfolipide, steroli, fosfatide.

Uleiul din fructe de cătină conține de asemenea acizii palmitic și palmitoleic, complexul de vitamine (B₁, B₂, B₆, C, E, K₂), flavonoide, cumarine și acizi organici; uleiul din semințe de dovleac conține și fitosteroli, cucurbitin.

Uleiul din semințe de dovleac manifestă acțiune anti-androgenică, antiaterosclerotică, hipolipemiantă, hepatoprotectoră, colagogă, coleretică, antiulceroasă și antiinflamatoare.

Fitosteroli, inhibând fermentul 5α-reductaza tipul II, reduc transformarea testosteronei în dihidrotestosteron (DHT). Fitosteroli posedă proprietatea de a se lege cu receptorii androgenici (RA), înlocuind competițiv dihidrotestosteronul, astfel impiedică formarea complexului puternic legat RA-DHT. Micșorarea cantității de dihidrotestosteron și a complexului RA-DHT reduce dimensiunile prostatei în hiperplazie.

Uleiul din semințe de dovleac la administrare îndelungată reduce nivelul de colesterol din sânge. Încetineste procesul de dezvoltare al țesutului conjunctiv și contribuie la regenerarea parenchimului în afecțiunile ficatului. Reduce procesele inflamatorii, preîntâmpină dezvoltarea cicatricilor, contribuie la restabilirea țesuturilor afectate.

Uleiul din fructe de cătină manifestă acțiune antibacteriană, antiulceroasă și reparatoare.

Inhibă activitatea diferitor tulpi de virusi, bacterii gram-pozițive și gram-negative, fungi genul *Candida* și a unor levuri, manifestă acțiune antibacteriană față de *Helicobacter pylori*. Diminuează procesul inflamator al mucoasei tractului gastrointestinal și contribuie la regenerarea ei. Normalizează secreția succului gastric, funcția motorie a stomacului și metabolismul. Flavonoidele și cumarinele, ce se conțin în fructele de cătină, contribuie la creșterea elasticității și reducerea permeabilității peretilor vasculari, previn formarea trombofilor.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

ADENOLIN se administrează în:

> Urologie pentru:

- reducerea riscului dezvoltării adenomului de prostată;
- suplinirea tratamentului complex al hiperplaziei benigne de prostată stadiu I și II;
- înălțarea fenomenelor discurse în adenomul de prostată (urinare dureroasă, frecvență și/sau cu dificultate să-i);
- profilaxia prostatitei cronice;

> Cardiologie pentru:

- reducerea nivelului de colesterol (hiperlipidemia de tipul III și IIb, profilaxia aterosclerozei, bolii coronariene ischemice, infarctului miocardic);

> Gastrologie pentru:

- suplinirea tratamentului:
 - * gastrite;
 - * ulcerul gastric și duodenal;
 - * colitei, colitei ulceroase nespecifice, enterocolitei;
 - scăderea hiperacidității gastrice;
 - regenerarea leziunilor țesutului hepatic (hepatita A, hepatita cronică, afecțiuni toxice ale ficatului, distrofia adipocasă a ficatului, ciroză hepatică);
 - înălțarea simptomelor în colecistiță cronică, coleciștocolangită, dischinezia căilor bilare;
 - ameliorarea stării generale în perioada postoperatorie după colecistectomie;
 - profilaxia litiazei biliare.

MOD DE UTILIZARE ȘI DOZE

Intern, cu 30 min înainte de mese, cu o cantitate suficientă de apă (circa 200 mL). Nu se admite înlocuirea apel cu alte lichide.

Copii cu vîrstă:

- 5-12 ani căte 1 capsulă de 1-2 ori pe zi;
- 12-18 ani căte 1-2 capsule de 2-3 ori pe zi.

Adulți căte 1-2 capsule de 3 ori pe zi. Durata utilizării constituie 4-8 săptămâni. În caz de necesitate administrarea se repetă după o pauză de cel puțin 1 lună.

REAȚII ADVERSE

În caz de hipersensibilitate la ingrediente produsului sunt posibile reacții alergice (prurit, urticare, edem facial, soc anafilactic).

În cazuri rare pot apărea tulburări gastrointestinale (ghețuri, vomă, diaree).

La depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, căt și la depistarea altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate individuală la ingrediente produsului, colicistită calcifică (periòada de acutizare), copii cu vîrstă sub 5 ani.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A se evita utilizarea suplimentului alimentar ca înlocuitor al unui regim alimentar variat.

Produsul conține substanțe cu potențial alergenic (galben opus de soare /sunset yellow/ FCF, ponceau 4R).

Dacă în timpul utilizării produsului apare febră, crampă, sănge în urină, micșorare dureroasă sau retenție urinară, administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul.

Produsul conține lactoză. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de lactază (Lappi sau sindrom de malabsorbție la glucoză și galactoză nu trebuie să utilizeze acest produs).

În caz de necesitate, în timpul sarcinii produsul poate fi utilizat sub supravegherea medicului.

Produsul nu influențează asupra capacitatii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

NATURA ȘI CONȚINUTUL AMBALAJULUI

6 blistere a căte 10 capsule împreună cu prospectul în cutie din carton.

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani.

A se consuma de preferință înainte de sfârșitul lunii și anului menționate pe ambalaj.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original pentru a fi protejat de lumina și umiditate.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

IM "VITAPHARM-COM" SRL
str. Lenin, 9, mun.Comrat,
MD-3812, UTA Găgăuzia,
Tel./fax: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md