

**Supliment alimentar  
PERSEVIT FORTE capsule**

**PERSEVIT FORTE** - fitopreparat combinat cu efect sedativ, destinat pentru menținerea stării funcționale normale a sistemului nervos în hiperexcitabilitate nervoasă, stres și tulburări de somn.

**COMPOZIȚIA**

Denumirea ingredientelor active	Cantitatea pentru	
	1 capsulă	2 capsule
Extract de Valeriană (3-9:1)	125 mg	250 mg
Extract de Roiniță (4-6:1)	50 mg	100 mg
Extract de Hamei (7-8:1)	25 mg	50 mg

**Ingrediente:** extract uscat din rădăcini de Valeriană (3-9:1); capsulă tare gelatinoasă; extract uscat din frunze de Roiniță (4-6:1); **lactoză monohidrat**; amidon de porumb; agent de încărcare celuloză microcristalină; extract uscat din conuri de Hamei (7-8:1); agenți antiaglomeranți dioxid de siliciu, stearat de magneziu.

**PROPRIETĂȚI**

Extractul din **rădăcini de Valeriană** conține uleiuri esențiale (componenții principali fiind eterii compuși ai borneolului și acidului izovalerianic), acizi organici, alcaloizi (valerenă și chatenina), saponini, glicozaide (valerid, valerozizi A, B și C), substanțe tanante (taninuri) și.a., care posedă acțiune sedativă, hypnotică, spasmolitică. Reduce excitabilitatea sistemului nervos central și vegetativ (tensiunea nervoasă și iritabilitatea ca rezultat al suprasolicitării psihice și neurastenilor). În insomnii restabilește somnul fiziologic normal: ușurează adormirea, îmbunătățește calitatea și durata somnului. În plus, complexul de substanțe biologic active ale Valerianei (Odoleanului) are efect coleretic, stimulează activitatea secretoriei a membranei mucoase a tractului digestiv; încetinește ritmul cardiac, dilată vasele coronariene și înălță spasmele acestora, scade tensiunea arterială.

Principalele substanțe active ale **frunzelor de Roiniță** (uleiuri esențiale (care conțin geraniol, nerol, citral, menalool, linalool etc.), glicozaide, terpene, flavonoide, acizii cafeic și clorogenic, substanțe tanante (îndeosebi acidul rozmarinic) și amare etc.) au efect sedativ, anticonvulsivant, spasmolitic, analgezic, hipotensiv, antiaritmic.

Extractul de Roiniță îmbunătățește procesul de digestie, posedă proprietăți antivomitive și moderat coleretice, normalizează pofta de mâncare scăzută (care este adesea întâlnită la pacienții cu neurastenia), contribuie la restabilirea florei intestinale saprofite și la secreția enzimelor digestive. Componentele Roiniței înălță formele ușoare de dismenoree, manifestările toxicozei la gravide, dereglașările climacterice, normalizează funcția glandelor genitale la bărbați.

În **conurile de Hamei** se conțin: glicozidul lupulin, vitamine (caroten, acid ascorbic, tiamină, acid nicotinic), uleiuri esențiale, acid valerianic, humulin, rășini de hamei, substanțe amare și taninuri, minerale, flavonoide și altele. Lupulina și uleiurile esențiale au efect sedativ asupra sistemului nervos central (ca tranchilizant în excitații, suprasolicitare nervoasă, neuroze, neurastenia, depresii ușoare) și hypnotic în insomnii.

Substanțele biologice active ce se conțin în plantă (inclusiv flavonoide, hormoni, vitamine) au acțiune antiinflamatoare, antiulceroasă, antialergică, spasmolitică, analgezică, dar și de fortificare a sistemului cardiovascular, mai ales în miocardul slabit. Îmbunătățesc digestia (stimulează pofta de mâncare, intensifică funcția secretorie și motorie a stomacului) și diureza.

**RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE**

**PERSEVIT FORTE** se administrează în:

- ✓ forme ușoare de neurastenia și neuroze, însușite de iritabilitate, anxietate, excitabilitate nervoasă, încordare cauzată de stres, oboseală, scădere concentrației atenției și memoriei, surmenaj psihic;
- ✓ forme ușoare (temporare) de tulburări ale somnului (dificultăți de adormire, ale calității somnului, insomnii), cauzate de hiperexcitabilitate nervoasă;
- ✓ dureri de cap, accese de migrenă, cauzate de suprasolicitare nervoasă;
- ✓ tensiune psihică permanentă ("sindromul managementului");
- ✓ forme ușoare de dismenoree, sindrom climacteric;
- ✓ distonie neurocirculatorie cu tahicardie, tulburări vegeto-vasculare cu hipertensiune arterială ușoară, sindrom asteno-vegetativ (oboseală pronunțată, tensiune nervoasă, anxietate, scădere capacitatea de muncă, concentrației și atenției, tremor, transpirație excesivă etc.);
- ✓ dereglașări funcționale ale organelor digestive pe fundal nervos (dischinezii ale căilor biliare, sindrom dispeptic, sindromul colonului iritabil).

**MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE**

Se administrează pe cale orală, indiferent de orarul meselor, cu o cantitate suficientă de apă (aproximativ 200 mL). Nu este permisă înlocuirea apei cu alte lichide.

Copii cu vârstă peste 12 ani câte 1 capsulă pe zi.

Adulți câte 1-3 capsule pe zi.

În insomnii câte 1-2 capsule cu 30 min - 1 oră înainte de culcare.

Durata administrării este de 2-4 săptămâni. În caz de necesitate este posibilă efectuarea curelor repetitive (după o pauză nu mai puțin de 1 lună sau după consultația medicului).

După intreruperea utilizării produsului nu apare sindromul de abstinență (sindrom de sevraj).

Dacă timp de 14 zile de la începutul utilizării preparatului nu se observă îmbunătățirea stării, trebuie să consultați medicul.

**REAȚII ADVERSE**

Produsul conține substanțe cu potențial alergen (**lactoză monohidrat**). În caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului sunt posibile reacții alergice (erupții cutanate, prurit, urticarie, hiperemia pielii, edeme periferice, dermatită alergică), dereglașări gastrointestinale (greață, vomă, spasme și dureri abdominale).

Foarte rar (sau în supradozare) pot apărea manifestări astenice (oboseală, apatie, indispoziție, reducerea capacitatei de muncă și concentrării atenției, instabilitate emoțională), somnolență și intensificarea efectului sedativ, tulburări vegetative (senzație de conștiință în piept, dispnee, bradicardie/tahicardie, tremor a mâinilor, dilatarea pupilelor etc.), care pot dispărea de la sine în decurs de 24 ore.

La depistarea reacțiiilor adverse menționate mai sus, cât și la apariția altor reacții adverse, administrarea produsului se intrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.

**CONTRAINDICAȚII**

Hipersensibilitate individuală sau intoleranță la ingredientele produsului, depresie sau alte stări însușite de inhibarea activității SNC, somnolență severă, sarcina și perioada de alăptare, copii cu vârstă sub 12 ani.

**AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE**

A nu se depăși doza zilnică recomandată. A se evita utilizarea suplimentului alimentar ca înlocuitor pentru un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Preparatul nu trebuie administrat neintrerupt mai mult de 1,5-2 luni.

Produsul conține lactoză. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest produs.

Nu se recomandă administrarea concomitantă a produsului cu sedativele sintetice (barbiturice și benzodiazepine), preparatele spasmolitice, hipotensive cu acțiune centrală fără consultația medicului (sporește acțiunea lor).

A se evita consumul băuturilor alcoolice pe perioada utilizării produsului.

Produsul are efect sedativ și poate influența negativ asupra capacitatei de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

**NATURA ȘI CONȚINUTUL AMBALAJULUI**

3 blistere a câte 10 capsule împreună cu prospectul în cutie din carton.

**TERMEN DE VALABILITATE**

3 ani.

A se consuma de preferință înainte de data înscrisă pe cutie/blister.

**CONDIȚII DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

**PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN RM:**

Întreprinderea Mixtă "VITAPHARM-COM" S.R.L.  
str. Lenin, 9/5, MD-3812, mun. Comrat,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova

Tel./fax: +(373 22) 260388

[www.vitapharm.md](http://www.vitapharm.md)