

PROSPECT

AVIRAL Pau D'Arco capsule

AVIRAL Pau D'Arco – supliment alimentar de origine vegetală cu acțiune antivirală, imunostimulatoare, antibacteriană, antiinflamatoare și analgezică.

COMPOZIȚIA

Denumirea substanțelor active și nutrimențelor	Cantitatea pentru		Cantitatea în % din VNR/DZ
	1 capsulă	2 capsule	
Extract uscat din scoarța internă de arborele furnicilor (<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl., cortex) (20:1), cu conținut de: - saponozide 50 % m/m	70 mg 35 mg	140 mg 70 mg	80 %
Vitamina C	40 mg	80 mg	100 %
Extract uscat din părți aeriene de hrișcă (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench., herba), cu conținut de: - flavonoide exprimate în rutină 80 % m/m	12,5 mg 10 mg	25 mg 20 mg	67 %
Ingrediente: amidon de porumb; capsulă gelatinoasă tare (<i>galben apus de soare FCF, ponceau 4R</i>); extract uscat din scoarța internă de arborele furnicilor; substanță suport celuloză microcristalină; acid L-ascorbic; extract uscat din părți aeriene de hrișcă; agenți antiaglomeranți (stearat de magneziu, dioxid de siliciu).			

VNR - Valoare nutrițională de referință

DZ - Doza zilnică

PROPRIETĂȚI

Extractul din scoarța internă de arborele furnicilor conține naftochinone (lapacol, β-lapacon, lapachenol), antrachinone (2-metil-antrachinon, antrachinon-2-aldehidă, tabebuin), flavonoide, xiloidină, indol, coenzima Q10, alcaloizi, saponine steroidiene, vitamine (C, B₁, B₂, β-caroten, niacină), minerale (zinc, calciu, cobalt, crom, fosfor, magneziu, mangan, potasiu, sodiu, seleniu, siliciu, fier) ș.a.

Naftochinonele, în special lapacolul și lapachenolul manifestă:

- acțiune antivirală (virusul gripal, *Herpes simplex*, *Influenza*, *Poliovirus hominis*, *Stomatitis vesicularis virus*);
- acțiune bactericidă față de bacteriile gram-pozitive (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus*, *Mycobacterium tuberculosis*) și gram-negative (*Shigella dysenteriae*, *Helicobacter pylori*, *Brucella*);
- acțiune antifungică față de *Candida albicans* și *Aspergillus*.

β-lapaconul posedă proprietăți antitumorale puternic pronunțate. Experimental a fost demonstrată acțiunea β-lapaconului asupra celulelor cancerigene ale prostatei, intestinului gros, glandelor mamare, ovarelor, pancreasului, plămânilor, măduvei osoase ș.a.

Extractul din părți aeriene de hrișcă conține 80% rutină, de asemenea alte flavonoide (cvercetină, vitexină, izovitexină), fagopirină, acid galic, acid cafeinic, vitamina PP, acid folic, riboflavină ș.a.

Rutina reduce permeabilitatea și fragilitatea capilarelor, sporește elasticitatea vaselor. Manifestă acțiune antiagregantă (reduce coagulabilitatea sângelui). Potențează capacitatea de apărare a organismului în radioterapii. Contribuie la micșorarea intensității procesului inflamator, înlătură edemul țesuturilor, ameliorează microcirculația în focarul inflamator, inhibă eliberarea mediatorilor inflamației.

Vitamina C contribuie la:

- menținerea și funcționarea normală a sistemului imunitar;
- formarea normală a collagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, sistemului osos, ligamentelor, pielii, gingiilor și dinților;
- metabolismul energetic normal;
- protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ;
- reducerea oboselii și extenuării.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

AVIRAL Pau D'Arco se administrează pentru:

- profilaxia gripei, cât și altor infecții virale și bacteriene ale căilor respiratorii superioare și inferioare;
- tratamentul complex al:
 - gripei, răcelii, faringitei, tonsilitei, rinitei, sinusitei, traheitei, bronșitei, pneumoniei;
 - herpesului de tip I și II (herpes simplu și genital);
 - candidozei și altor infecții fungice;
 - gastritei și ulcerului gastroduodenal;
 - proceselor inflamatorii de diversă etiologie și localizare (stomatite, gingivite ș.a.);
 - leucemiei, limfomului Hodgkin și altor maladii oncologice;
- sporirea rezistenței organismului la infecții.

MOD DE UTILIZARE ȘI DOZE

Intern, în timpul meselor, cu o cantitate suficientă de apă (circa 200 mL). Nu se admite înlocuirea apei cu alte lichide.

Copii cu vârsta:

- 5-12 ani câte 1 capsulă de 1-2 ori pe zi;
- 12-18 ani câte 1 capsulă de 2 ori pe zi.

Adulți câte 1 capsulă de 2-3 ori pe zi. Doza zilnică poate fi mărită până la 6 capsule.

Durata utilizării constituie 2-4 săptămâni. În dependență de severitatea maladiei perioada de utilizare a produsului poate fi prelungită la recomandarea medicului. În caz de necesitate administrarea se repetă după o pauză de cel puțin 1 lună.

REAȚII ADVERSE

În caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului sunt posibile reacții alergice (prurit, erupții cutanate, urticarie). În cazuri rare pot apărea grețuri și vomă. La depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la depistarea altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate individuală la ingredientele produsului, sarcină și perioada de alăptare, copii cu vârsta sub 5 ani.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A se evita utilizarea suplimentului alimentar ca înlocuitor al unui regim alimentar variat.

Produsul conține substanțe cu potențial alergen (*galben apus de soare FCF, ponceau 4R*).

Produsul reduce coagularea sângelui. Nu se recomandă administrarea concomitentă a produsului cu warfarină, clopidogrel și acid acetilsalicilic, deoarece crește riscul hemoragiilor.

Produsul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

NATURA ȘI CONȚINUTUL AMBALAJULUI

3 blistere a câte 10 capsule împreună cu prospectul în cutie din carton.

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani.
A se consuma de preferință înainte de sfârșitul lunii și anului menționate pe ambalaj.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

ÎM “VITAPHARM-COM” SRL
str. Lenin, 9, mun.Comrat, MD-3812,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
Tel./fax: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md

Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj.