

**Supliment alimentar
BEBEVIT soluție**

BEBEVIT – complex polivitaminic, destinat pentru suplinirea deficitului de vitamine, dezvoltarea fizică și cognitivă normală, întărirea imunității.

COMPOZIȚIA

Denumirea ingredientelor active	Cantitatea pentru 10 mL	% VNR
Vitamina C	50 mg	63 %
Vitamina E	5 mg-a-ET	42 %
Niacină (Vitamina PP)	10 mg	63 %
Acid pantotenic (Vitamina B ₅)	4 mg	67 %
Vitamina B ₆	2 mg	143 % ¹
Tiamină (Vitamina B ₁)	1,8 mg	164 % ¹
Vitamina K ₂	22 µg	29 %
Riboflavină (Vitamina B ₂)	2 mg	143 % ¹
Vitamina D ₃	5 µg	100 %

Ingrediente: apă purificată, suc concentrat de struguri, zahăr, corector de aciditate acid citric, acid L-ascorbic, acetat de DL-alfa-tocoferil, acid nicotinic, conservant sorbat de potasiu, D-pantotenat de calciu, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de tiamină, menachinonă, riboflavină, colecalciferol.

VNR - valoare nutrițională de referință

¹Nu depășește doza zilnică maximală.

PROPRIETĂȚI

Vitaminele ce se conțin în produsul BEBEVIT contribuie la:

- funcționarea normală a sistemului nervos (C, PP, B₁, B₂, B₆);
- menținerea sănătății psihice (C, PP, B₁, B₆) și performanța mentală normală (B₅);
- funcționarea normală a inimii (B₁);
- menținerea vederii normale (B₂);
- funcționarea normală a sistemului imunitar (C, B₆, D₃);
- creșterea absorbtiei fierului (C), calciului și fosforului (D₃);
- menținerea concentrației normale de calciu în sânge (D₃);
- metabolismul normal al fierului (B₂), homocisteinei, proteinelor, glicogenilor (B₆), utilizarea calciului și fosforului (D₃);
- formarea normală (B₆) și menținerea în stare normală a globulelor roșii (B₂);
- coagularea normală a sângeului (K₂);
- formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, sistemului osos, ligamentelor, gingiilor, pielii și dintilor (C);
- menținerea sănătății membranelor mucoase, pielii (PP, B₂), sistemului osos (K₂, D₃) și dintilor (D₃);
- sinteza normală a cisteinei (B₆); sinteza normală și metabolizarea hormonilor steroidi, a vitaminei D și a unor neurotransmițitori (B₅);
- reglarea activității hormonale (B₆);
- protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ (C, E, B₂);
- menținerea funcției normale a sistemului muscular (D₃);
- metabolismul energetic normal (C, PP, B₁, B₂, B₅, B₆);
- reducerea oboselii și extenuării (C, PP, B₂, B₅, B₆).

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

BEBEVIT se administrează pentru:

- profilaxia hipovitaminozelor;
- dezvoltarea fiziologică normală a organismului copilului;
- suplinirea deficitului de vitamine în stări ale organismului însotite de necesitate crescută de vitamine:
 - perioada de creștere intensivă la copii;
 - eforturi fizice și neuro-psihice crescute;
 - perioada de convalescență (însănătoșire) după suportarea unor afecțiuni sau traume;
 - extenuări la copii de vârstă școlară;
 - regim alimentar neregulat, incomplet sau unilateral;
- întărirea imunității;
- creșterea poftei de mâncare.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

Se administrează pe cale orală, după mese. A se agita înainte de utilizare.

Cu ajutorul seringii pentru administrare orală se măsoară cantitatea necesară de produs. Pentru a măsura corect volumul soluției, pistonul seringii se coboară până la capătul cilindrului, apoi se introduce seringa în soluție și se ridică pistonul până la apariția cifrelor volumului necesar de produs. Seringa pentru administrare orală, înainte și după utilizare, se spală cu apă fiartă caldă.

Copii cu vârstă:

- 1-3 ani câte 2 mL soluție de 2 ori pe zi;
- 4-6 ani câte 3 mL soluție de 2 ori pe zi;
- 7-9 ani câte 4 mL soluție de 2 ori pe zi;
- 10-18 ani câte 5 mL soluție de 2 ori pe zi.

Adulti câte 10 mL soluție una dată pe zi.

Gravide câte 5 mL soluție de 2 ori pe zi.

Durata administrării este de o lună. În caz de necesitate este posibilă efectuarea curelor repetitive după o pauză de 1-3 luni.

REAȚII ADVERSE

Produsul nu conține substanțe cu potențial alergen. În caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului sunt posibile reacții alergice.

La depistarea reacțiilor adverse administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate individuală la ingredientele produsului, copii cu vârstă sub 1 an.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A se evita utilizarea suplimentului alimentar ca înlocuitor al unui regim alimentar variat.

Nu se recomandă administrarea concomitantă a produsului cu alte preparate polivitaminice.

Produsul conține zahăr invertit. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la fructoză sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să administreze acest produs.

Pacienții cu diabet zaharat trebuie să ia în considerare faptul, că 1 mL produs conține 0,48 g fructoză și glucoză. A se evita consumul băuturilor alcoolice pe perioada utilizării produsului.

Produsul nu influențează asupra capacitatei de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

NATURA ȘI CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Câte 100 mL soluție în flacoane (borcane) din polimer sau sticlă de culoare brună.

Câte 1 flacon (borcan) împreună cu seringă pentru administrare orală și prospectul în cutie din carton.

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani.

A se consuma de preferință înainte de data înscrisă pe cutie/etichetă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperatură sub 25°C, în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. A nu se congela. După deschidere a se păstra flaconul (borcanul) la frigider (2-8 °C).

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN RM:

Întreprinderea Mixtă "VITAPHARM-COM" S.R.L., str. Lenin, 9, MD-3812, mun. Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova.
Tel./fax: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md