

REZISTAL

capsule

SUPLIMENT ALIMENTAR

Aviz de notificare eliberat de

Centrul Național de Sănătate Publică

Ambalaj 60 capsule - № 065-7/168 din 03.05.2013

COMPOZIȚIA

Denumirea ingredientelor	Cantitatea pentru 3 capsule	Cantitatea în % din DUT* / DZR**
Substanțe active		
Extract uscat din <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd.) DC., corticis radix (Scoarta rădăcinilor de gheara pisicii) (4:1) Extragent: apă/etanol 96 % V/V	450 mg	45%
Vitamina C (sub formă de acid ascorbic)	150 mg***	187,5 %
Zinc (sub formă de oxid de zinc)	9,6 mg (12 mg)	96 %
Vitamina A (sub formă de extract uscat din <i>Daucus carota L. ssp. sativus</i> , radix (Rădăcini de morcov sălbatic) cu conținut de β-caroten 10 %) Extragent: apă/etanol 96 % V/V	150 µg ER (9 mg)	18,8 %
Excipienti: amidon de porumb, celuloză microcristalină, stearat de magneziu.		

* Doza unică terapeutică

** Doza zilnică recomandată

*** Nu depășește doza zilnică maximală, care constituie 900 mg Vitamina C.

REZISTAL – supliment alimentar cu acțiune imunomodulatorie, antivirală, antiinflamatoare, antitumorale, antiagregantă, antioxidantă și detoxifiantă.

Extract din scoarța rădăcinilor de gheara pisicii
conține alcaloizi oxiindolici pentaciclici (izopteropodină, pteropodină, izomitrafilină, mitrafilină, izorincofilină, rincofilină, speciofilină, uncarină), polifenoli (epicatechină, proantocianidine), flavonoide, glicoizide de acid quinovic, triterpene și fitosteroli.
Alcaloizi oxiindolici pentaciclici activează fagocitoza, funcția T-limfocitelor și macrofagilor, datorită căruia fapt posedă proprietăți imunomodulatorie puternice pronunțate, de asemenea manifestă acțiune anti-inflamatoare. Rincofilina inhibă agregarea trombocitelor, astfel, reduce probabilitatea formării trombilor și îmbunătățește proprietățile reologice ale săngelui. Epicatechina și glicoizidele de acid quinovic exercită acțiune antivirală (inclusiv față de virusii hepatitei și herpesului). Terpenele și fitosterolii determină proprietăți antiinflamatoare, citostatice (activează celulele T-killer) ale produsului.
Polifenolii și proantocianidinele sunt antioxidanti puternici, blochează procesele induse de radicalii liberi în organism.

Vitamina C contribuie la:

- funcționarea normală a sistemului imunitar;
- formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge și ligamentelor;
- metabolismul energetic normal;
- protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ;
- reducerea oboselii și extenuării.

Zincul contribuie la:

- funcționarea normală a sistemului imunitar;
- sinteza normală de ADN;
- sinteza normală a proteinelor;
- menținerea sănătății sistemului osos;
- protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ;
- procesul de diviziune celulară.

Vitamina A contribuie la:

- funcționarea normală a sistemului imunitar;
- procesul de diferențiere celulară.

REZISTAL se administrează pentru:

- sporirea imunității în stări imunodeficitare de diversă geneză;
- profilaxia și terapia complexă a infecțiilor bacteriene și virale (hepatită, herpes), inclusiv infecției HIV;
- înlăturarea proceselor inflamatorii și inflamator-degenerative ale articulațiilor și țesuturilor moi (artrite, reumatism), rigidității matinale;

- protecția celulelor și profilaxia complicațiilor în urma radioterapiei și chimioterapiei bolilor oncologice;
- reducerea riscului de formare a trombilor și infarctului miocardic;
- încetinirea progresării SIDA și reducerea reacțiilor adverse ale medicamentelor antiretrovirale.

MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

Intern, în timpul mesei, cu o cantitate suficientă de apă (circa 200 mL). Nu se admite înlocuirea apei cu alte lichide.

Adulti și copii peste 12 ani: câte 1 capsulă de 3 ori pe zi.

Durata administrării de la 1 până la 3 luni.
În caz de necesitate administrarea se repetă după o pauză de cel puțin 1 lună.

REAȚII ADVERSE

Produsul nu conține substanțe cu potențial alergenic. În caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului sunt posibile reacții alergice (urticarie, prurit).

În cazuri rare pot apărea tulburări gastrointestinale (greață, vomă, diaree).

La depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la depistarea altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate individuală la ingredientele produsului, transplantarea de organe și măduvă osoasă, transfuzie de sânge, vaccinare, hemofilie, scleroza multiplă, tuberculoză, planificarea sarcinii, graviditate și perioada de alăptare, copii cu vârstă sub 12 ani.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. La administrarea produsului mai mult de 8 săptămâni este necesară monitorizarea nivelului de estradiol și progesteron în plasmă.

Produsul trebuie administrat cu precauție în hemoragii sau în predispunere la hemoragiile, precum și persoanelor care administreză anticoagulanți (warfarină, acenocumarol). Este necesar de a întrebupe administrarea produsului cu 7-10 zile înainte de interventiile chirurgicale.

Nu se recomandă administrarea concomitantă a imunoglobulinelor, preparatelor hormonale, precum și a altor complexe vitamino-minerale, care conțin vitamina C, A și zinc, din cauza posibilei acțiuni sinergice și a riscului de supradозare.

Suplimentul alimentar nu înlocuiește un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos.

Produsul nu influențează asupra capacitatii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

NATURA ȘI CONȚINUTUL AMBALAJULUI

6 blistere a căte 10 capsule împreună cu instrucțiunea pentru administrare în cutie din carton.

TERMENUL DE VALABILITATE

3 ani.

A se consuma, de preferință, până la expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

CONDITII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi 15-25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină și umiditate. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici!

DENUMIREA ȘI ADRESA FIRMEI PRODUCĂTOARE

ÎM "VitaPharm-Com" SRL
str. Lenin, 9, mun.Comrat, MD-3812,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
tel./fax: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md