

NARIMAX FORTE

capsule

INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

Compoziție:

O capsulă 100 mg conține nu mai puțin de $3,1 \times 10^8$ de lactobacterii viabile liofilizate (*Lactobacillus acidophilus* Er – Zun. 317/402), bifidobacterii (*Bifidobacterium bifidum*), bacteria coli (*Escherichia coli* M-17).

Substanțe auxiliare: nu conține.

Modul de administrare:

Adulți și copiii peste 12 ani: cite 2 capsule 3 ori pe zi;
Copiii cu vîrsta cuprinsă între 2 și 12 ani: cite 1-2 capsule 2 ori pe zi.

Copiii cu vîrsta cuprinsă între 6 luni și 2 ani: cite ½ de capsulă 3 ori pe zi.

Se administrează cu 15-20 minute înainte de masă.

Durata tratamentului:

În mediu 4-6 săptămîni, în dependență de cauza dezvoltării disbiozei și particularitățile individuale ale organismului.

Indicații speciale de utilizare:

Capsulele Narimax Forte, se recomandă de administrat cu o cantitate mică de apă la temperatura camerei. Se permite deschiderea capsulei și dizolvarea conținutului în lichid.

Femeilor însărcinate se permite de administrat după consultația medicului.

Adnotare la suplimentul alimentar: "Narimax Forte"

Este bine cunoscut faptul ca microflora intestinală normală joacă un rol esențial pentru activitatea vitală a organismului uman. Ea inhibă creșterea microorganismelor patogene, de putrefacție, participă la metabolismul și sinteza vitaminelor, stimulează sistemul imunitar. Devierea de compoziție calitativă și cantitativă a florei normale, cunoscută sub numele de disbioză intestinală duce la dezvoltarea bolilor sistemului digestiv, sistemului hematopoietic, sistemului imun; dezvoltarea hipotrofiei, anemiei, enzimoterapiei. În același timp, tulburările microbiocenozei intestinale sînt însoțite întotdeauna de infecții intestinale acute și o serie de alte boli. În astfel de cazuri vin în ajutor probioticele concepute pentru restabilirea microflorei intestinale normale și sistemului reproductiv al femeii (după boli infecțioase, tratamentul cu antibiotice). Efectul terapeutic al preparatelor, care conțin lactobacterii se datorează efectului antagonist al lactobacteriilor față de microorganismele patogene, inclusiv stafilococi, bacili E-coli, bacilul *Proteus*, *Shigella*, care determină acțiuni corective, în cazul dereglărilor de bacteriocenoză.

Proprietăți:

- Menține, restabilește și îmbunătățește microflora saprofită intestinală.
- Posedă efect imunomodulator;
- Manifestă activitate antagonistă față de un spectru larg

Contraindicații și reacții adverse:

Hipersensibilitate individuală la componentele preparatului. Alte contraindicații și reacții adverse nu au fost depistate.

Prezentare ambalaj:

Capsule de culoare albă umplute cu pulbere, de culoare crem spre bej-deschis, gust și miros de lapte acru. O cutie de carton conține 2 sau 3 blistere a câte 10 capsule împreună cu instrucțiunea pentru administrare.

Păstrare:

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura pină la 10°C. A nu se lăsa la îndemîna și vederea copiilor.

Termen de valabilitate:

2 ani. A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Denumirea și adresa producătorului:

Produs de "VitaWay" SRL
la comanda "VitaPharm-Com" SRL
ÎM moldo-americană
MD3800, Republica Moldova,
mun. Comrat, str. Lenin 9
Tel./fax (+373 22) 26 03 88

- de microorganisme patogene și condițional-patogene;
- Contribuie la neutralizarea produselor toxice ale metabolismului;
- Contribuie la asimilarea mineralelor (inclusiv calciu, fosfor, fier), proteinelor, carbohidraților;
- Posedă capacitate de producere a vitaminelor (în special grupa B);
- Previne dezvoltarea bolilor intestinale cu evoluție tenantă;
- Sporesc rezistența organismului.

Indicații pentru utilizare:

Se recomandă de administrat în calitate de sursă suplimentară în caz de:

- Disbioze de diversă etiologie, în special deficitul de E-coli, bifido și lactobacterii;
- Gastroenterite de diversă etiologie;
- Infecții intestinale acute;
- Disfuncție intestinală de lungă durată de etiologie necunoscută;
- Tratamentul dezinteriei, cu evoluție prelungită sau cronică a bolii;
- Colite cronice de diversă etiologie (inclusiv colita ulceroasă nespecifică);
- Tratamentul și profilaxia bolilor cronice ale TGI;
- Bolii surmenante și stres prelungit;
- Intervenții chirurgicale pe organele TGI (perioada pre- și postoperatorie);
- Predispoziție la reacții alergice.

Fiți sănătoși!

**Acest produs nu este medicament
Însoțiți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe ambalaj.**