

**Добавка к пище
БЕБЕВИТ раствор**

БЕБЕВИТ – поливитаминный комплекс, предназначенный для восполнения дефицита витаминов, нормального физического и умственного развития, укрепления иммунитета.

СОСТАВ

Наименование активных ингредиентов	Количество для 10 мл	% РНП
Витамин С	50 мг	63 %
Витамин Е	5 мг α-ТЭ	42 %
Ниацин (Витамин РР)	10 мг	63 %
Пантотеновая кислота (Витамин В ₅)	4 мг	67 %
Витамин В ₆	2 мг	143 % ¹
Тиамин (Витамин В ₁)	1,8 мг	164 % ¹
Витамин К ₂	22 мкг	29 %
Рибофлавин (Витамин В ₂)	2 мг	143 % ¹
Витамин D ₃	5 мкг	100 %

Ингредиенты: вода очищенная, концентрированный виноградный сок, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота, L-аскорбиновая кислота, DL-альфа-токоферола ацетат, никотиновая кислота, консервант сорбат калия, D-пантотенат кальция, пиридоксина гидрохлорид, тиамин гидрохлорид, менахинон, рибофлавин, холекальциферол.

*РНП - Рекомендуемая норма потребления
Не превышает верхний допустимый уровень потребления.*

СВОЙСТВА

Витамины содержащиеся в продукте БЕБЕВИТ способствуют:

- нормальной работе нервной системы (С, РР, В₁, В₂, В₆);
- нормальной психологической (С, РР, В₁, В₆) и умственной деятельности (В₃);
- нормальному функционированию сердца (В₁);
- поддержанию нормального зрения (В₂);
- нормальному функционированию иммунной системы (С, В₆, D₃);
- повышению абсорбции железа (С), кальция и фосфора (D₃);
- нормальному уровню кальция в крови (D₃);
- нормальному усвоению железа (В₂), гомоцистеина, протеина, гликогена (В₆), кальция и фосфора (D₃);
- нормальному образованию (В₆) и поддержанию нормального состояния красных кровяных телец (В₂);
- нормальной свертываемости крови (К₂);
- образованию коллагена для нормальной работы кровеносных сосудов и скелета;
- нормальному функционированию хрящей, десен, кожи и зубов (С);
- поддержанию нормального состояния слизистых оболочек, кожи (РР, В₂), скелета (К₂, D₃) и зубов (D₃);
- нормальному синтезу цистеина (В₆);
- нормальному синтезу и усвоению стероидных гормонов, витамина D и некоторых нейромедиаторов (В₅);
- регуляции гормональной активности (В₆);
- защите клеток от оксидативного стресса (С, Е, В₂);
- нормальной мышечной функции (D₃);
- нормальному энергетическому обмену веществ (С, РР, В₁, В₂, В₅, В₆);
- снижению усталости и утомления (С, РР, В₂, В₅, В₆).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БЕБЕВИТ принимают для:

- профилактики гиповитаминозов;
- нормального физиологического развития организма ребенка;
- восполнения дефицита витаминов при состояниях организма, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах:
 - период интенсивного роста детей;
 - повышенные физические и нервно-психические нагрузки;
 - период выздоровления после перенесенных заболеваний или травм;
 - переутомление у детей школьного возраста;
 - нерегулярный, неполноценный или однообразный рацион питания;
- укрепления иммунитета;
- повышения аппетита.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь, после еды. Перед применением необходимо взбалтывать.

С помощью дозирующего шприца измеряют необходимое количество продукта. Для правильного измерения объема раствора поршень шприца опускают до конца цилиндра, затем погружают шприц в раствор и поднимают поршень до появления отметки необходимого объема продукта. Дозирующий шприц или мерный стаканчик, до и после использования промывают теплой кипяченой водой.

Детям в возрасте:

- 1-3 лет по 2 мл раствора 2 раза в день;

- 4-6 лет по 3 мл раствора 2 раза в день;
- 7-9 лет по 4 мл раствора 2 раза в день;
- 10-18 лет по 5 мл раствора 2 раза в день.

Взрослым по 10 мл раствора в день.

Беременным по 5 мл раствора 2 раза в день.

Продолжительность применения составляет один месяц. При необходимости возможно проведение повторных курсов после перерыва 1-3 месяца.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Продукт не содержит вещества с алергизирующим потенциалом. При гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции. При появлении побочных реакций необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу или фармацевту.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость или гиперчувствительность к ингредиентам продукта, детям до 1 года.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, доступных для детей.

Не рекомендуется одновременное применение продукта с другими поливитаминными препаратами.

Продукт содержит инвертный сахар. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости фруктозы или синдрома мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать данный продукт.

Больные сахарным диабетом должны учитывать, что 1 мл продукта содержит 0,48 г фруктозы и глюкозы. Рекомендуется избегать употребления алкогольных напитков в период применения продукта.

Продукт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или обслуживать установок.

УПАКОВКА

По 100 мл раствора во флаконах полимерных или стеклянных коричневого цвета.

По 1 флакону вместе с дозирующим шприцем или мерным стаканчиком и листком-вкладышем в картонной пачке.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Употребить предпочтительно до истечения срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке для защиты от света.

Не замораживать. После вскрытия флакон хранить в холодильнике (2-8 °С).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В РМ:

Întreprinderea Mixtă "VITAPHARM-COM" S.R.L.
ул. Ленина, 9/5, MD-3812, мун. Комрат,
АТО Гагаузия, Республика Молдова
Тел./факс: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md