

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

Добавка к пище
ХОЛИЦИН сироп

ХОЛИЦИН – биологически активная добавка к пище, которая защищает нервные клетки от неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды, способствуя улучшению когнитивных функций мозга.

СОСТАВ

Наименование активного ингредиента	Количество в 1 мл сиропа
Цитиколин	100 мг

Состав: вода очищенная, сахар, подсластитель фруктоза, цитиколин натрия, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия.

СВОЙСТВА

ЦИТИКОЛИН обладает ноотропными и нейропротективными свойствами. В организме метаболизируется с образованием холина и цитидина, участвует в биосинтезе лецитина.

Усиливает мозговое кровообращение и обогащает мозг кислородом. Способствует улучшению памяти, повышению концентрации внимания, сохранению умственной работоспособности.

Нейропротективное действие связано с тем, что цитиколин:

- ✓ стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов в мембренах нейронов, улучшает функцию ионообменных насосов мембран нервных клеток и нейрорецепторов;
- ✓ восстанавливает поврежденные мембранны клеток и благодаря стабилизирующему действию на мембрану нейронов уменьшает отек мозга;
- ✓ поддерживает энергетические резервы нейронов и стимулирует синтез ацетилхолина и дофамина;
- ✓ препятствует избыточному образованию свободных радикалов и предотвращает гибель клеток.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ХОЛИЦИН принимают для:

- ✓ уменьшения последствий перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС (задержка развития, когнитивные нарушения, угроза развития ДЦП, врожденные аномалии);
- ✓ обеспечения прогрессивного развития двигательных функций и эмоциональной сферы у недоношенных детей;
- ✓ сокращения сроков восстановления после перенесенной черепно-мозговой травмы и хирургических операций на головном мозге;
- ✓ уменьшения возбудимости при синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей;
- ✓ дополнения комплексной терапии эpileпсии;
- ✓ улучшения памяти, увеличения способности концентрироваться, адаптации к интеллектуальным нагрузкам;
- ✓ сохранения и частичного восстановления памяти у пожилых людей с нарушениями функций головного мозга сосудистого и/или дегенеративного генеза;
- ✓ коррекции последствий перенесенного ишемического или геморрагического инсульта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь, во время или сразу после приема пищи. Перед применением необходимо взбалтывать.

С помощью дозирующего шприца измеряют необходимое количество продукта. Для правильного измерения объема сиропа поршень шприца опускают до конца цилиндра, затем погружают шприц в сироп и поднимают поршень до появления отметки необходимого объема продукта. Дозирующий шприц или мерный стаканчик, до и после использования, промывают теплой кипяченой водой.

Детям по 1 мл сиропа 2-3 раза в день.

Взрослым по 5 мл сиропа 2-3 раза в день.

Дозы могут быть изменены врачом в зависимости от степени повреждения головного мозга.

Продолжительность употребления зависит от тяжести состояния и может длиться от 1,5 до 3 месяцев.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Продукт не содержит вещества с аллергизирующим

потенциалом. При гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, анафилактический шок). При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу или фармацевту.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость или гиперчувствительность к ингредиентам продукта.

Гипертонус парасимпатической нервной системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, доступных для детей.

Не рекомендуется употреблять цитиколин одновременно с меклофеноксатом.

Во избежание бессонницы последний прием продукта должен быть не позднее 17 часов.

При беременности применяется только по назначению врача, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Сведения относительно экскреции цитиколина или его метаболитов в грудное молоко отсутствуют. В период применения продукта необходимо прерывать грудное вскармливание.

Продукт содержит фруктозу и глюкозу. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости фруктозы или синдрома мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать данный продукт.

Больные сахарным диабетом должны учитывать, что 1 мл продукта содержит 0,66 г фруктозы и глюкозы.

Рекомендуется избегать употребление алкогольных напитков в период применения продукта.

Продукт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или обслуживать установки.

УПАКОВКА

По 100 мл сиропа в полимерных или стеклянных флаконах коричневого цвета.

По 1 флакону вместе с дозирующим шприцем или мерным стаканчиком и листком-вкладышем в картонной пачке.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Употребить предпочтительно до истечения срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке для защиты от света.

Не замораживать. После вскрытия флакон хранить в холодильнике (2-8 °C).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В РМ:

Întreprinderea Mixtă "VITAPHARM-COM" S.R.L.
ул. Ленина, 9/5, MD-3812, мун. Комрат,
ATO Гагаузия, Республика Молдова
Тел./факс: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md