

**Добавка к пище**  
**Неовита Са+вит. D капсулы**

**Неовита Са+вит. D** – биологически активный комплекс, предназначен для поддержания нормальной функции скелетно-мышечной системы.

**СОСТАВ**

1 капсула содержит: цинка оксид – 7,5 мг, меди сульфат – 1 мг, кальция глюконат – 300 мг, магния оксид – 40 мг, марганца сульфат – 1,8 мг, натрия тетраборат – 250 мкг, холекальциферол – 5 мг.

*Вспомогательные вещества:* магния стеарат, кукурузный крахмал, микрокристаллическая целлюлоза.

*Пищевая ценность:* углеводы – 30 мг/капс (3,75 г/100 г продукта).

*Энергетическая ценность:* 0,12 ккал/капс (15 ккал/100 г продукта).

**СВОЙСТВА**

**Кальций** наиболее распространенный макроэлемент в организме и общее его количество составляет около 2% массы тела, при этом 99% сосредоточено в костях скелета и 1% - в составе всех органов, тканей и биологических жидкостях организма.

Кальций способствует:

- ✓ поддержанию нормального состояния скелета и зубов;
- ✓ нормальной передаче нервных импульсов;
- ✓ нормальной мышечной функции;
- ✓ нормальной свертываемости крови;
- ✓ нормальному энергетическому обмену веществ;
- ✓ нормальному действию пищеварительных ферментов;
- ✓ нормальному процессу деления и дифференцировки клеток.

**Холекальциферол** стимулирует синтез белка, транспортирующего кальций и способствующего его всасыванию в кишечнике, почечной реабсорбции, отложению в костях.

**Магний** регулирует обменные процессы в костной ткани, минерализацию, поддерживает гибкость и прочность, стимулирует восстановление костной ткани после переломов. Применение магния способствует повышению плотности кости.

**Цинк** - это минерал, который помогает в синтезе коллагена и играет важную роль в процессе остеогенеза остеобластов. Дефицит цинка связан с замедлением метаболизма костей и снижением их плотности.

**Марганец** участвует в процессах остеосинтеза. Дефицит марганца может привести к повышенной хрупкости костей.

**Медь** - составляющий компонент многих ферментов, которые участвуют в обмене железа, обеспечении тканей кислородом. В костной ткани медь отвечает за образование коллагена, его связь с эластином и общую минерализацию скелета. Недостаток меди приводит к нарушениям формирования костной и соединительной ткани, угнетению роста кости.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Неовита Са+вит. D** принимают:

- ✓ для предупреждения и восполнения дефицита кальция в организме (при гипокальциемии);
- ✓ при повышенной потребности в минерале в период интенсивного роста и развития молодого организма (детей, подростков);
- ✓ для укрепления опорно-двигательного аппарата и зубов;
- ✓ при остеопорозе (постменопаузальном, старческом) и его осложнениях (переломах костей);
- ✓ для ускорения регенерации и восстановления костной ткани после спортивных травм, переломов и операций.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Внутрь, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды (около 200 мл). Не допускается заменять воду другими жидкостями.

*Детям в возрасте:*

- 7-11 лет по 1 капсуле в день;

- 12-17 лет по 1 капсуле 2 раза в день.

*Взрослым* по 1 капсуле 3 раза в день.

Продолжительность применения составляет 4 недели.

При необходимости возможно проведение повторных курсов (после перерыва продолжительностью не менее 2-3 месяца или после консультации с врачом).

**ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Продукт не содержит вещества с аллергизирующим потенциалом. При гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (крапивница, зуд, кожные высыпания).

При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу или фармацевту.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Индивидуальная гиперчувствительность или непереносимость к ингредиентам продукта, беременность и период грудного вскармливания, детям до 7 лет.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, доступных для детей.

Не рекомендуется одновременное применение продукта с витаминно-минеральными комплексами или совместно с другими препаратами содержащие кальций, цинк, медь, магний, марганец, натрий и витамин D<sub>3</sub>.

Левотироксин, глюкокортикостероиды, гормональные противозачаточные средства для системного применения ухудшают всасывание ионов кальция.

Рекомендуется избегать употребление алкогольных напитков в период применения продукта.

Продукт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или обслуживать станок.

**УПАКОВКА**

6 блистеров по 10 капсул вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

**СРОК ГОДНОСТИ**

3 года.

Употребить предпочтительно до даты, указанной на пачке/блистере.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить при температуре +15...+25°C в сухом месте, защищенном от света.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В РМ:**

Întreprinderea Mixtă "VITAPHARM-COM" S.R.L.

ул. Ленина, 9/5, MD-3812, мун. Комрат,

АТО Гагаузия, Республика Молдова

Тел./факс: +(373 22) 260388

www.vitapharm.md