

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕЗИСТАЛ

капсулы

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

СОСТАВ

Наименование ингредиентов	Количество для 3 капсул	Количество в % от РТД* / АУП**
Активные вещества		
<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd.) DC., corticis radix (Кошачьего когтя коры корней) экстракт сухой (4:1) Экстрагент: вода/этанол 96 % об/об	450 мг	45%
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты)	150 мг***	187,5 %
Цинк (в виде цинка оксида)	9,6 мг (12 мг)	96 %
Витамин А (в виде <i>Daucus carota L. ssp. sativus</i> , radix (Моркови дикой корни) экстракт сухой с содержанием β-каротина 10 %) Экстрагент: вода/этанол 96 % об/об	150 мкг РЭ (9 мг)	18,8 %
Вспомогательные вещества: кукурузный крахмал, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.		

*Разовая терапевтическая доза

**Адекватный уровень потребления

***Не превышает верхний допустимый уровень потребления, который составляет 900 мг для Витамина С.

РЕЗИСТАЛ – биологически активная добавка к пище с иммуномодулирующим, противовирусным, противоспазмическим, противоопухолевым, антиагрегантным, антиоксидантным, детоксикационными действиями.

Кошачьего когтя коры экстракт содержит пентациклические оксииндолные алкалоиды (изоптероподин, птероподин, изомитрафилин, митрафилин, изоринхофилин, ринхофилин, специофилин, ункарин), полифенолы (эпикатехин, проантоцианидины), флавоноиды, гликозиды хинной кислоты, тритерпены и фитостеролы. Пентациклические оксииндолные алкалоиды активируют фагоцитоз, функции Т-лимфоцитов и макрофагов, благодаря чему обладают ярко выраженным иммуномодулирующими свойствами, а также оказывают противовоспалительное действие. Ринхофилин ингибирует агрегацию тромбоцитов, таким образом, снижает вероятность тромбообразования и улучшает реологические свойства крови. Эпикатехины и гликозиды хинной кислоты оказывают противовирусное (в том числе в отношении вирусов, вызывающих гепатиты и герпес) действие. Тriterpenы и фитостеролы обуславливают противовоспалительные, цитостатические (активируют Т-киллер клетки) свойства продукта. Полифенолы и проантоцианидины являются сильными антиоксидантами, блокируют процессы вызванные свободными радикалами в организме.

Витамин С способствует:

- нормализации функции иммунной системы;
- образования коллагена для нормального функционирования кровеносных сосудов и связок;
- нормализации энергетического метаболизма;
- защите клеток от оксидативного стресса;
- снижению утомляемости и усталости.

Цинк способствует:

- нормализации функции иммунной системы;
- нормализации синтеза ДНК;
- нормализации синтеза белков;
- сохранение здоровья костной ткани;
- защите клеток от оксидативного стресса;
- процессу деления клеток.

Витамин А способствует:

- нормализации функции иммунной системы;
- процессу дифференциации клеток.

РЕЗИСТАЛ принимают для:

- повышения иммунитета при иммунодефицитных состояниях различного генеза;
- профилактики и в комплексной терапии бактериальных и вирусных инфекций (гепатиты, герпес), включительно ВИЧ инфекций;

- устранения воспалительных и воспалительно-дегенеративных процессов суставов и мягких тканей (артриты, ревматизм), утренней скованности;
- защиты клеток и профилактики осложнений при радиотерапии и химиотерапии онкологических заболеваний;
- снижения риска тромбообразования и инфаркта миокарда;
- замедления прогрессирования СПИДа и уменьшения побочных действий антиретровирусных препаратов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь, во время еды, запивая достаточным количеством воды (около 200 мл). Не допускается заменять воду другими жидкостями.

Взрослым и детям старше 12 лет:

по 1 капсуле 3 раза в день.

Продолжительность употребления от 1 до 3 месяцев. При необходимости возможно проведение повторных курсов через 1 месяц.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Продукт не содержит вещества с аллергизирующим потенциалом. При гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции (крапивница, зуд).

В редких случаях могут возникнуть желудочно-кишечные нарушения (тошнота, рвота, диарея). При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная гиперчувствительность к ингредиентам продукта, трансплантация органов и костного мозга, переливание крови, вакцинация, гемофилия, рассеянный склероз, туберкулез, планирование зачатия, беременность и период грудного вскармливания, детям до 12 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. При применении препарата более 8 недель необходимо следить за уровнем эстрadiола и прогестерона в плазме. С осторожностью следует применять продукт при кровотечениях или при склонности к кровотечениям, а также лицам, принимающим антикоагулянты (варфарин, аценокумарол). Необходимо прекратить прием продукта за 7-10 дней до хирургических вмешательств. Не рекомендуется одновременное применение иммуноглобулинов, гормональных препаратов, а также витаминно-минеральных комплексов, содержащие витамин С, А и цинк, из-за возможного синергетического действия и риска передозировки. Биологически активная добавка к пище не заменяет разнообразное и сбалансированное питание, а также здоровый образ жизни. Продукт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или обслуживать установки.

УПАКОВКА

6 блистеров по 10 капсул вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Употреблять, предпочтительно, до истечения срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре 15-25°C, в оригинальной упаковке для защиты от света и влаги.

Хранить в недоступном для маленьких детей месте!

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СП "VitaPharm-Com" ООО
ул. Ленин, 9, мун.Комрат, МД-3812,
ATO Гагаузия, Республика Молдова
тел./факс: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md